ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

БОБРЫЕ ВЕСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Газета Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова

Выпуск № 4 (28)
2021

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ

Большой подорлик

Богатая видами и распространённая по всему свету группа дневных хищных птиц имеет характерный «хищный» облик. Это крепкий недлинный клюв с острым загнутым надклювьем (клюв крючком), короткие, но сильные ноги с длинными и сильно изогнутыми когтями. Самка всегда крупнее и сильнее самца. Из органов чувств на первом месте стоит зрение. Крылья у хищников большие и широкие.

Большая часть хищников питается мясом пойманных животных: ловят мелких млекопитающих и птиц, также земноводных, рыб, некоторые виды хищных птиц поедают насекомых. Сокола, бросаясь за добычей, развивают скорость до 350 км/час.

Практически все хищники живут парами, которые могут сохраняться много лет. Птенцы появляются на свет в разное время, потому что самка начинает насиживать кладку сразу же после откладки первого яйца. Поэтому в одном гнезде находятся и уже довольно крупные птенцы, и совсем маленькие.

В Воронежском заповеднике обитают дневные хищные птицы 3-х семейств: Скопиные, Ястребиные, Соколиные.

Канюк *Buteo lagopus*

Обычный гнездящийся перелётный вид. Прилетает в первой половине апреля. Хищник средних размеров, плотного телосложения, с широкими закруглёнными крыльями. Хвост относительно короткий и широкий.

Его голос – гнусавое «кьяааа». У беспокоящихся птиц крики очень занудны и соответствуют слову «канючить».

Гнёзда размещает в лесах различных типов. Охотно занимает и достраивает гнёзда хищников и ворон. Самка откладывает 1-5 яиц и насиживает от 28 до 35 дней. Самец снабжает самку кормом и лишь иногда ненадолго садится на гнездо. Когда птенцы подрастут, охотится и самка. В течение всего гнездового периода практически ежедневно приносят в гнездо зелёные ветки.

Пища канюка разнообразна, но основу составляют полёвки, мыши и другие мелкие животные.

С конца августа – в сентябре наступает осенний пролёт. Иногда встречается в заповеднике зимой в годы с небольшим снегом и обилием грызунов.

Зимняк *Buteo lagopus*

Обычный зимующий вид, появляется в заповеднике во второй половине октября. Внешне похож на канюка, но крупнее. Подолгу парит, часто охотится в медленном полёте, при ветре может зависать на месте.

Голос похож на крик канюка, отличается только тоном.

Эта птица придерживается окраин леса, полян, порубок и других открытых мест. Численность зимняков в заповеднике подвержена значительным колебаниям, в зависимости от наличия пищи.

Питается в основном мышевидными грызунами, в годы с малым количеством грызунов переключается на ловлю птиц, не брезгует падалью.

В феврале – начале марта откочёвывает на север.

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus*

Малочисленный гнездящийся, перелётный вид. Прилетает в заповедник в середине апреля – мае.

Средней величины хищная птица. Небольшой клюв делает осоеда похожим на кукушку, вокруг клюва имеются жёсткие перышки, похожие на чешую, что помогает при ловле жалящих насекомых.

Гнездится в различных лесах, преимущественно смешанных, с полянами и лугами. В кладке обычно бывает 2 яйца. Насиживают яйца самка и самец 28-35 дней. Питаются главным образом личинками ос и шмелей, которых добывают из гнёзд этих насекомых. Ловят и взрослых крупных насекомых, реже лягушат, ящериц, грызунов или птенцов мелких птиц.

Улетают на зимовку в августе – сентябре. Зимуют в Африке.

Змееяд *Circaetus gallicus*

Очень редкий гнездящийся, перелётный вид. В заповеднике гнездится 2-4 пары. Прилетают после схода снега в одно и то же место.

Обитает там, где высока численность змей и мало людей. Питается змееяд пресмыкающимися, в особенности змеями: увидев змею, круто пикирует, хватает её лапой за голову, чтобы избежать укусов. Убитую змею проглатывает целиком, в гнездо несёт добычу в клюве или лапах, чаще полузаглоченной. К змеиному яду его организм не восприимчив. Помимо змей, ловит ящериц, мелких грызунов, птенцов, лягушек.

В кладке только 1 яйцо. Насиживает самка яйца 46-48 дней, самец её кормит. Осенью улетают в Африку.

Причина редкости вида: низкая численность змей и низкая плодовитость этого вида птиц.

Орёл-карлик *Aquila pennata*



Орёл-карлик в полёте

Малочисленный гнездящийся, перелётный вид. Прилетает в первой половине апреля. На гнездовом участке криклив, его голос похож на свистовое «ку-ит».

Размах крыльев всего 100-130 см, масса до 1,3 кг. От своих крупных родичей отличается меньшей осторож-



Молодая особь

ностью, но большей ловкостью. Очень энергичный хищник.

Гнездится орёл в пойменных ольшаниках, реже в сосновых борах и дубравах, недалеко от реки, гнёзда высоко от земли на ольхах или дубах. В кладке 2 яйца. Питается мелкими птицами. Он хватает их как на лету, так и сидящих на земле, хотя не отказывается ни от мышей, ни от ящериц.

Улетает в сентябре. Зимует в Австралии, Африке, Монголии.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*

Малочисленный зимующий и очень редкий гнездящийся вид. Крупный хищник, у взрослых птиц хвост чисто-белый. Клюв массивный, жёлтого цвета. Размах крыльев до 2,5 м, масса тела от 3 до 7 кг.

Гнездо представляет огромную постройку 1,5-2 метра и служит одной и той же паре в течение многих лет. В кладке 2-3 яйца. В насиживании участвуют оба родителя.

Питается рыбой, чаще снулой, падалью. Живая добыча достаётся нечасто (утки, гуси, зайцы, суслики, полёвки). В первую очередь вылавливает раненых и больных животных.

Тетеревятник *Milvus migrans*

Молодой тетеревятник

Обычный гнездящийся, осёдлый вид. Крупный ястреб. Размах крыльев 96-127 см, масса тела 520-2000 г.

Для гнездования предпочитает старые деревья, занимая нижние части кроны. Кладка состоит из 3-5 яиц.

Взрослая особь

Охотится из засады и одинаково легко хватает сидящую или летящую добычу. Питается птицами и млекопитающими. Если есть возможность, он сначала убивает столько птиц, сколько ему удаётся поймать, и затем только принимается за еду. Иногда добывает белок, крыс, полёвок и других мелких зверьков.

При появлении ястреба многие мелкие птицы собираются общей стаей и преследуют хищника.

Тетеревятник – осёдлая птица, на зиму перемещается ближе к сёлам, железнодорожным станциям и городам, где с успехом ловит голубей и ворон.

Чёрный коршун *Milvus migrans*



Малочисленный гнездящийся, перелётный вид. Чаще всего прилетает в середине апреля. От других хищников отличается хвостом с выемкой.

Часто селится в поймах рек, отдыхает и гнездится на деревьях, поэтому в степи эта птица не встречается.

Питается мелкими животными: мышами, реже птенцами, насекомыми, червями, может брать съестное на помойках и свалках, поедает выброшенную на берег рыбу и падаль, которая иногда составляет главную часть его пищи.

Гнездится преимущественно в пойменных ольховых лесах, гнездо обычно находится в кроне и малозаметно. Кладка состоит из 1-3 яиц. Насиживает главным образом самка.

До вылета птенцы 1,5 месяца сидят в гнезде. Сразу же после вылета молодых у птиц начинаются местные кочёвки, и в начале сентября коршуны сбиваются в стаи и отлетают.

Зимуют в тропических районах Африки и Азии.

Перепелятник *Accipiter nisus*

Малочисленный гнездящийся, осёдло-кочующий вид. Масса тела 100-340 г, длина 28-41 см, размах крыльев 55-78 см. У самцов верхняя часть тела сизо-серая, а нижняя светло-серая, с рыжими или коричневато-бурыми поперечными полосами. Самка заметно крупнее самца.

В период размножения населяет леса различных типов. Строительство гнёзд начинается во второй половине апреля, откладка яиц – в начале мая.

Гнёзда размещают на боковых ветвях у стволов деревьев на высоте 6-10 м.

В кладке 3-6 яиц. Насиживает самка, после откладки второго или третьего яйца самец приносит ей пищу. В случае приближения человека заранее слетает с гнезда и скрывается, или напротив, вжимается в гнездо, стараясь быть незамеченной. Инкубация длится 32-35 дней. Питаются в основном мелкими воробьиными птицами. Самка может поймать птицу величиной с голубя, но далеко унести её чаще не в силах.

Вне периода размножения широко кочуют, сопровождая пролётные или зимующие стаи птиц. Нередко придерживаются населённых пунктов, охотясь на воробьёв и синиц.

Чеглок *Falco subbuteo*

Малочисленный гнездящийся, перелётный вид. Небольшой, размером с голубя, сокол контрастной окраски, тёмно-сизый сверху, и светлый, с многочисленными тёмными пестринами – снизу. Масса тела 130-340 г, длина 28-38 см, размах крыльев 70-92 см. Прилетает во второй половине апреля. Собственных гнёзд не строит, а занимает постройки других птиц, в основном воронов. У ворона птенцы покидают гнёзда в мае. Пара чеглоков заранее присматривает такое гнездо и держится поблизости, поджидая вылета молодых воронов. Откладка яиц начинается в конце мая и начале июня. В кладке 2-4 яйца. Насиживает самка в течение 28-29 дней, самец приносит ей пищу. Чеглоки охотятся на ласточек и других мелких воробьиных птиц и грызунов. Кроме того, ловят в значительном числе крупных насекомых – жуков, стрекоз, кузнечиков, бабочек, которых хватают лапами и поедают на лету.

Осенний пролёт и отлёт на места зимовок в Южную Африку происходят в сентябре.

Луговой лунь *Circus pygargus*

Обычный гнездящийся, перелётный вид. Хищная птица средних размеров, немного крупнее вороны. Масса тела 220-450 г, длина 41-52 см, размах крыльев 97-120 см. Прилетают в последней декаде апреля или в первых числах мая. Птицы летят днём, в одиночку, на отдых останавливаются в полях.

Самки строят на земле из стеблей злаков и мелкого бурьяна небольшое плоское гнездо.

Величина кладки изменяется от 4 до 6 яиц.

Насиживает только самка, после откладки первого яйца сидит очень плотно, в этот период её кормит самец, в случае приближения человека взлетает с гнезда почти из-под ног.

Кормят птенцов оба родителя, состав пищи взрослых птиц и птенцов разнообразный и зависит от его обилия в природе. Это мышевидные грызуны, ящерицы, мелкие птицы, насекомые.

Осенний отлёт и пролёт происходят во второй половине августа и сентябре. Зимуют луговые луни в Африке.

Болотный лунь *Circus aeruginosus*



Обычный гнездящийся, перелётный вид. Хищник средней величины. Масса тела 0,4-0,8 кг, длина 48-55 см, размах крыльев 110-142 см. В окраске самца сочетаются серебристо-сизые (большая часть крыльев и хвост) и коричневые (туловище, часть крыла сверху, голова) цвета. Крылья на концах чёрные. Самка почти сплошь коричневая разных оттенков. Молодые птицы похожи на самку, имеют однотонную тёмно-бурую окраску. Птицы приобретают окончательный вид на четвёртом (самцы) или третьем (самки) году жизни, пройдя ряд промежуточных нарядов.

Весной прилетает в первой половине апреля, очень редко – в конце марта. Первыми обычно появляются самцы, вслед за ними прилетают самки. В полной кладке 3-7, чаще 4-5 яиц, откладываемых с интервалом в два дня.

В случае разорения гнезда птицы предпринимают вторую попытку размножения, поэтому гнёзда с ненасиженными яйцами могут быть обнаружены и в июне.

Состав кормов весьма разнообразный. Болотные луни кормятся в основном мышевидными грызунами. Гораздо реже добывают птиц. Осенний отлёт и пролёт начинаются уже в середине августа и в основном заканчиваются в первой половине сентября. Зимуют в Южной Европе и Центральной Африке.

Большой подорлик *Clanga clanga*

Большой подорлик в заповеднике – редкий, нерегулярно гнездящийся вид.

Имеет длину тела 65–73 см и массу тела 1,6–3,2 кг. Оперение взрослых птиц (от трёх лет и старше) однотонное, тёмно-бурое, затылок и подхвостье окрашены несколько светлее. Ноги оперены до самых пальцев.

Большой подорлик обитает в смешанных лесах, а также возле пойменных лугов, болот, рек и озёр. Охотясь, подорлик парит на большой высоте или разыскивает добычу на земле.

Пищей подорликам служат грызуны (большей частью водяные полёвки), пресмыкающиеся, земноводные и мелкие птицы.

Гнездится большой подорлик на деревьях. Одно гнездо птицы часто используют несколько раз. В кладке 1-3, но чаще 2 пёстрых яйца. Младший птенец, вылупившийся из яйца, отложенного вторым, подвергается гонениям старшего и, как правило, погибает в первые две недели жизни. В возрасте 8-9 недель птенцы большого подорлика встают на крыло, и, в зависимости от места гнездования, в сентябре или октябре подорлики отлетают на зимовку. Зимует в Индии, Иране и Индокитае.

Учредитель: Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова
Адрес редакции и издателя: 394080, г. Воронеж, Госзаповедник, Центральная усадьба. Тел.: (473) 259-45-49, 259-45-60
E-mail: zapovednik-vrnru@ya.ru, zapovednikvrn@mail.ru

Тексты: Пётр Венгеров
Фото: Пётр Венгеров
Редакторы: Дина Свиридова, Евгения Зверева, Александр Черёмухин

Изготовлено и отпечатано: ООО «БиомикАктив»
г. Воронеж, ул. Солнечная, 33
Сдача по графику в печать: 11.09.2021 г.
Дата выхода в свет: 13.09.2021 г. Заказ № 1269. Тираж 250 экз.